ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ελισάβετ Κάννα[1], Ζωή Λαμπρινού[1], Μαρίνα Βακάκη[2], Δημήτριος Δογάνης[3], Μόσχος Βερβερίδης[1], Ιωάννης Σκόνδρας[1]

1. Β' Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠΑ «Π.&Α. Κυριακού»
2. Ακτινολογικό Τμήνα ΓΝΠΑ «Π.&Α. Κυριακού»
3. Ογκολογικό Τμήμα ΓΝΠΑ «Π.&Α. Κυριακού»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι χωροκατακτητικές εξεργασίες των επινεφριδίων στη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία αποτελούν σπάνιες οντότητες που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ιστολογικών τύπων, από καλοήθεις αγγειακές αλλοιώσεις έως κακοήθεις νευροβλαστικούς όγκους. Ενώ η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή είναι ευρέως καθιερωμένη στους ενήλικες, η εφαρμογή της σε βρέφη και νήπια παραμένει περιορισμένη λόγω τεχνικών και ανατομικών ιδιαιτεροτήτων. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων της λαπαροσκοπικής προσπέλασης σε παιδιατρικούς ασθενείς της κλινικής μας, με επινεφριδικές μάζες, εστιάζοντας στην ογκολογική ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη τεσσάρων ασθενών (ηλικίας 4, 18, 20 και 22 μηνών) που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή τη χρονική περίοδο 2025 - 2026. Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε πλάγια διαπεριτοναϊκή προσπέλαση. Κατεγράφησαν και αναλύθηκαν η κλινική εικόνα, τα απεικονιστικά ευρήματα, η χειρουργική τεχνική, η ιστοπαθολογική διάγνωση και η μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επιτυχή λαπαροσκοπική εξαίρεση, χωρίς διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτήθηκε διεγχειρητική μετάγγιση αίματος, ενώ ο χειρουργικός χρόνος κυμάνθηκε μεταξύ 1,5 και 2,5 ωρών. Η ιστολογική διάγνωση αφορούσε σε τρεις κακοήθεις νευροβλαστικούς όγκους διαφορετικής διαφοροποίησης και μια καλοήθη αγγειακή αλλοίωση. Όλοι οι ασθενείς σιτίστηκαν άμεσα από το στόμα και έλαβαν εξιτήριο τη 2η μετεγχειρητική ημέρα. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δεν παρατηρήθηκαν τοπική υποτροπή ή όψιμες επιπλοκές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή με πλάγια διαπεριτοναϊκή προσπέλαση αποτελεί ασφαλή, ριζική και αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση νεοπλασμάτων των επινεφριδίων σε βρέφη και νήπια. Η ελάχιστα επεμβατική αυτή προσέγγιση προσφέρει άριστα χειρουργικά αποτελέσματα, ελάχιστη απώλεια αίματος και ταχεία

ανάρρωση, διασφαλίζοντας παράλληλα τα αναγκαία ογκολογικά πρότυπα για την ασφαλή εξαίρεση μικρών επινεφριδικών όγκων.